

**Choisir le traitement
antirétroviral (TAR) : travailler avec des
personnes vivant avec le VIH pour
trouver le meilleur schéma
thérapeutique**

Une conversation entre :



Dr Christoph Boesecke

Université de Bonn,
Bonn, Allemagne



Dr Tristan Barbier

Royal Free London NHS Foundation Trust,
Londres, Royaume-Uni



Ordre du jour

Choisir le schéma thérapeutique du TAR : options disponibles et comment opter pour la plus adaptée

Prise de décision partagée : travailler avec des personnes vivant avec le VIH pour améliorer les résultats du TAR

Identifier l'insatisfaction face au traitement chez les personnes vivant avec le VIH : quand réviser le traitement schéma thérapeutique du TAR

Choisir le schéma thérapeutique du TAR : options disponibles et comment opter pour la plus adaptée

Dr Christoph Boesecke

Université de Bonn,
Bonn, Allemagne



Schémas thérapeutiques recommandés par l'EACS pour les patients adultes n'ayant jamais reçu de TAR

Schémas thérapeutiques à trois médicaments¹

| Classes de médicaments ¹ | Associations ¹ | Pilules/jour ²⁻¹¹ |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 2x NRTI + 1x INSTI | ABC/3TC/DTG TAF/FTC/BIC | Un |
| | ABC/3TC + DTG TAF/FTC + DTG TDF/XTC* + DTG TAF/FTC + RAL TDF/XTC* + RAL | Deux ou plus |
| 2x NRTI + 1x NNRTI | TDF/3TC/DOR | Un |
| | TAF/FTC + DOR TDF/XTC* + DOR | Deux |

Schémas thérapeutiques à deux médicaments¹

| Classes de médicaments ¹ | Associations ¹ | Pilules/jour ^{5,12-14} |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1x NRTI + 1x INSTI | 3TC/DTG | Un |
| | XTC + DTG | Deux ou plus |

Principales recommandations :

- ABC contre-indiqué pour les personnes ayant obtenu un résultat positif au test HLA-B*57:01
- TDF ou TAF doivent être inclus en cas d'infection par le VHB
- Les INSTI ou les TAF peuvent être associés à une prise de poids
- Le choix entre TDF ou TAF dépend des caractéristiques individuelles et de la disponibilité
- Les schémas thérapeutiques à deux médicaments ne sont pas recommandés pour les personnes ayant une CV > 500 000 copies/ml ou après un échec de la PrEP

* L'association à dose fixe TDF/3TC n'est pas répertoriée dans www.ema.europa.eu/en/medicines et il est possible qu'elle ne soit pas disponible dans certains pays européens.

3TC, lamivudine ; ABC, abacavir ; BIC, bictégravir ; CV, charge virale ; DOR, doravirine ; DTG, dolutégravir ; EACS, European AIDS Clinical Society ; FTC, emtricitabine ; HLA-B, antigène leucocytaire humain-B ; INSTI, inhibiteur de transfert de brins de l'intégrase ; NNRTI, non NRTI ; NRTI, inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse ; PrEP, prophylaxie pré-exposition ; RAL, raltégravir ; TAF, ténofovir alafénamide ; TAR, traitement antirétroviral ; TDF, fumarate de ténofovir disoproxil ; VHB, virus de l'hépatite B ; XTC, 3TC ou FTC.

1. Lignes directrices de l'EACS version 12.0, octobre 2023. Disponible sur : www.eacsociety.org/media/guidelines-12.0.pdf (consulté le 21 juin 2024) ;

2. AEM. RCP ABC/3TC/DTG. 2024 ; 3. AEM. RCP TAF/FTC/BIC. 2023 ; 4. AEM. RCP ABC/3TC. 2023 ; 5. AEM. RCP DTG. 2023 ; 6. AEM. RCP TAF/FTC. 2023 ;

7. AEM. RCP TDF/FTC. 2024 ; 8. FDA. TDF/3TC PI. 2019 ; Disponible sur : <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm> (consulté le 21 juin 2024) ;

9. AEM. RCP RAL. 2024 ; 10. AEM. RCP TDF/3TC/DOR 2024 ; 11. AEM. RCP DOR. 2023 ; 12. AEM. RCP 3TC/DTG. 2024 ; 13. AEM. RCP du 3TC. 2022 ;

14. AEM. RCP de la FTC. 2023. Tous les RCP de l'AEM sont disponibles sur : www.ema.europa.eu/en/medicines (tous consultés le 21 juin 2024).



Prise de décision partagée : travailler avec des personnes vivant avec le VIH pour améliorer les résultats du TAR

Dr Christoph Boesecke


Université de Bonn,
Bonn, Allemagne




Implication des patients dans les décisions de traitement

Enquête sur les perspectives positives 2019 auprès de personnes vivant avec le VIH dans 25 pays (N=2 389)


Souhaitez-vous participer aux décisions concernant votre traitement ?



Avez-vous le sentiment que vous comprenez suffisamment votre traitement ?




Vous sentez-vous suffisamment informé pour être impliqué dans les choix de traitement ?



Fardeau posologique du TAR

Comparaison des résultats de l'enquête Positive Voices 2022 réalisée auprès de personnes vivant avec le VIH au Royaume-Uni en 2017 (N=4 422)¹ vs 2022 (4 540)^{2*}

Nombre de comprimés (pilules) du TAR pris quotidiennement¹



*Données collectées respectivement de janvier à septembre 2017, en avril 2022 et en mars 2023.

TAR, traitement antirétroviral ; VIH, virus de l'immunodéficience humaine.

1. Aghaizu A, et al. UK Health Security Agency, London. 2023 ; Disponible sur : www.gov.uk/government/publications/hiv-positive-voices-survey/positive-voices-2022-survey-report (consulté le 10 juin 2024) ; 2. Kall M, et al. Public Health England, London. 2020 ; Disponible sur https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20231023211755mp_/https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e1dfbede5274a4e9d7dc720/PHE_positive_voices_report_2019.pdf (consulté le 10 juin 2024).

Identifier l'insatisfaction face au traitement chez les personnes vivant avec le VIH : quand réviser le schéma thérapeutique du TAR

Dr Christoph Boesecke

Université de Bonn,
Bonn, Allemagne



Implication des patients dans les décisions de traitement

Enquête sur les perspectives positives 2019 auprès de personnes vivant avec le VIH dans 25 pays (N=2 389)

Personnes vivant avec le VIH qui ont estimé que leur traitement contre le VIH pouvait être amélioré

